

## RECOMMANDATIONS DE LA SFAR



- Prise en charge anesthésique des patients en hospitalisation ambulatoire
- Prise en charge de l'arrêt cardiaque
- Prise en charge de la douleur postopératoire chez l'adulte et l'enfant
- Prise en charge des nausées et vomissements postopératoires
- Antibiothérapie probabiliste des états septiques graves
- Pratique des anesthésies locales et locorégionales par des médecins non spécialisés en anesthésie-réanimation, dans le cadre des urgences
- Anesthésie locorégionale chez l'enfant
- Ventilation non invasive au cours de l'insuffisance respiratoire aiguë (nouveau-né exclu)
- Prise en charge de la douleur post opératoire chez l'adulte et l'enfant
- Sédation et analgésie en réanimation (nouveau-né exclu)
- Transfusion érythrocytaire en réanimation (nouveau-né exclu)
- Prévention des infections nosocomiales en réanimation – transmission croisée et nouveau-né exclus
- Prise en charge hémodynamique du sepsis sévère (nouveau-né exclu)
- Prise en charge des crises d'asthme aiguës graves de l'adulte et de l'enfant (à l'exclusion du nourrisson)
- Prise en charge de l'état de mal épileptique (enfants - adultes)
- Utilisation des catécholamines au cours du choc septique (adultes - enfants)
- Quel abord trachéal pour la ventilation mécanique des malades de réanimation ? (à l'exclusion du nouveau-né)
- Indications de la curarisation en anesthésie
- Corticothérapie au cours du choc septique et du SDRA
- Remplissage vasculaire au cours des hypovolémies relatives ou absolues
- Attitude pratique pour la prise en charge de la douleur postopératoire



Mise à jour le 9 mars, 2010